

# ¡QUE NI AL MEJOR CAZADOR SE LE ESCAPE LA LIEBRE!

Las actividades estacionales de caza comercial de liebre europea han comenzado. El Senasa informa sobre los procesos de control que lleva adelante para la obtención de productos inocuos.

## PROCESO DE FAENA Y ELABORACIÓN DE CORTES DE CARNE DE LIEBRE

### PRINCIPALES ENFERMEDADES

#### Mixomatosis

La difusión dentro de la población de lepóridos se realiza por el contacto directo entre animales o por la acción vehiculizada de insectos como mosquitos y pulgas. Los signos clínicos son edemas y nódulos o mixomas en cara y genitales; hinchazón de los labios, el hocico y la base de las orejas.

#### VHD

La principal vía de contagio es la oral, la conjuntiva ocular y la respiratoria, también se produce a través de heridas en la piel. Esta enfermedad se distribuye rápidamente afectando a muchos individuos en poco tiempo, normalmente a conejos de 45 días en adelante.

#### Tularemia

Puede afectar a mamíferos, aves, reptiles y anfibios. La transmisión en animales se realiza mediante contacto directo con orina, heces y secreciones, y a través de vectores artrópodos como pulgas y garrapatas. En liebres y roedores la letalidad es alta.

### PROCESO DE FAENA Y ELABORACIÓN

